




## Fiche d'information sur la gastroscopie

L'endoscopie gastrique sert à détecter et à traiter à temps troubles et les modifications pathologiques.

### Déroulement de l'examen

Avant l'examen, une voie veineuse sera posée. Après l'entretien avec le médecin et avant le début de l'examen, on vous administrera un somnifère (Propofol). Vous ne remarquerez presque rien de l'examen proprement dit. Le médecin introduit l'endoscope flexible sous control visuel à travers le larynx dans l'œsophage, puis dans l'estomac. C'est là que le passage vers l'estomac est examiné afin de détecter une éventuelle inflammation, une hernie diaphragmatique ou un ulcère gastrique. Si nécessaire, des biopsies sont prélevées pour détecter les inflammations et la colonisation par *Helicobacter pylori*. Les hémorragies peuvent être traitées directement. L'appareil est ensuite introduit dans le duodénum pour y détecter également des ulcères et prélever des échantillons de tissus.



### Les risques

La gastroscopie et le prélèvement d'échantillons de tissus présentent généralement peu de complications. Toutefois, des blessures ou des saignements peuvent survenir dans de rares cas. Les troubles respiratoires ou cardiovasculaires sont très rares et peuvent généralement être résolus sans problème grâce à la surveillance. Les réactions indésirables ou allergiques aux médicaments sont pratiquement exclues grâce à un interrogatoire ciblé.

### Préparation

**6 heures** avant l'examen, il est conseillé de ne rien manger afin que l'estomac soit libre de tout résidu alimentaire. Les liquides clairs comme l'eau et le thé clair sont autorisés. Vous prenez vos médicaments comme d'habitude, il y a des indications spéciales pour les patients qui prennent des anticoagulants. Deux heures avant l'examen, il est conseillé de ne pas boire.

### Après l'examen

**Jusqu'à 12 heures après l'examen**, vous ne pouvez **ni conduire ni signer valablement** en raison du traitement somnifère. Organisez un moyen de transport pour rentrer chez vous ou utilisez les transports publics.

Vous pouvez à nouveau manger et boire immédiatement, une sensation passagère de ballonnement est normale et disparaît rapidement. Si des douleurs, des nausées/vomissements ou du sang dans les selles (généralement noir) apparaissent après la gastroscopie, **veuillez-nous en informer immédiatement par téléphone : +41 32 322 19 88** ou vous adresser au **Centre hospitalier Bienne : +41 32 324 30 30**.