



## Fiche d'information sur l'anticoagulation

Les médicaments anticoagulants augmentent le risque de saignement lors d'interventions endoscopiques, comme l'ablation de polypes. C'est pourquoi ils doivent généralement être arrêtés quelques jours avant l'intervention. Il s'agit notamment de :

- Anticoagulants oraux comme Marcoumar®, Sintrom®, Xarelto®, Eliquis®, Lixiana®, Pradaxa®.
- Les antiplaquettaires comme le clopidogrel (Plavix®), Efient®, Brilique®.

Discutez de l'arrêt avec votre médecin de famille, un spécialiste des vaisseaux ou un cardiologue. Dans certains cas, un traitement de transition avec des injections d'héparine est nécessaire. Si vous souffrez d'insuffisance rénale, les intervalles d'arrêt doivent éventuellement être prolongés, veuillez en discuter avec votre médecin traitant. Les médicaments contenant de l'aspirine ne doivent généralement pas être arrêtés, sauf en cas de risques particuliers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au **+41 32 322 19 88**.

Dans le tableau suivant, vous trouverez un aperçu des médicaments qui fluidifient le sang et les périodes d'arrêt correspondantes avant l'intervention.

Medicament	Quand arrêter
Marcoumar® (Phenprocoumon)	5-7 jours avant l'examen avec mesure de l'INR
Sintrom® (Acenocumarol)	5-7 jours avant l'examen avec mesure de l'INR
Xarelto® (Rivaroxaban)	Dernière dose 48h avant l'intervention
Eliquis® (Apixaban)	Dernière dose 48h avant l'intervention
Lixiana® (Edoxaban)	Dernière dose 48h avant l'intervention
Pradaxa® (Dabigatran)	Dernière dose 72h avant l'intervention
Clopidogrel (Plavix®)	5 jours avant l'intervention, en accord avec le service de cardiologie ou d'angiologie
Aspirin cardio, Aspégic, Tiatral	Ne doivent pas être retirés
Efient® (Prasugrel) et Brilique® (Ticagrelor)	5 jours avant l'intervention, en accord avec le service de cardiologie ou d'angiologie

Recommandations ESGE : Veitch, Andrew M et al. "Endoscopy in patients on antiplatelet or anticoagulant therapy: British Society of Gastroenterology (BSG) and European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline update." *Endoscopy* vol. 53,9 (2021): 947-969. doi:10.1055/a-1547-2282