



## Fiche d'information sur la coloscopie

La coloscopie permet d'identifier et de traiter les causes des troubles et des modifications pathologiques.

### Comment se déroule la coloscopie ?

Avant l'examen, on vous pose une voie veineuse et, après un entretien avec le médecin, on vous administre un somnifère (propofol). Vous ne remarquerez presque rien de l'examen proprement dit. Si vous le souhaitez, vous pouvez suivre l'examen à l'écran.



Lors de l'endoscopie du côlon, un endoscope flexible est introduit par l'anus dans le côlon nettoyé et avancé jusqu'à l'embouchure de l'intestin grêle et sur quelques centimètres dans l'intestin grêle. Pour déployer l'intestin, on utilise du gaz CO<sub>2</sub> ou de l'eau. La muqueuse est alors observée de près, et un intestin bien nettoyé est essentiel pour détecter les modifications pathologiques. Si nécessaire, des échantillons de tissus (biopsies) sont prélevés.

### Quels sont les risques liés à cette intervention ?

L'examen et le prélèvement d'échantillons de tissus présentent généralement peu de complications. Lors du prélèvement d'un échantillon de tissu (ablation de polypes), des complications telles qu'une lésion de la paroi intestinale, une perforation ou une hémorragie peuvent rarement survenir. Très rarement, un deuxième examen ou une opération sont nécessaires en raison d'une complication. Les troubles respiratoires ou cardiovasculaires (chute de tension, obstruction spasmodique des voies respiratoires) liés à la sédation sont très rares et pratiquement exclus grâce à un interrogatoire ciblé.

### Après l'examen :

**Jusqu'à 12 heures après l'examen**, vous ne pouvez **ni conduire ni signer valablement** en raison de la médication somnifère. Organisez un moyen de transport pour rentrer chez vous ou utilisez les transports en commun.

Après l'examen, il se peut que vous ressentiez temporairement une pression dans l'abdomen et qu'un peu de sang soit évacué lors de la première selle. En cas de saignement goutte à goutte de l'anus, **veuillez-nous en informer immédiatement par téléphone : +41 32 322 19 88** ou vous rendre au **Centre hospitalier Bienne : +41 32 324 30 30**.